

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente



# irireact

3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione  
Feniramina maleato + Tetrizolina cloridrato  
Medicinale equivalente

## Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al medico o al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se non nota un peggioramento dei sintomi dopo 4 giorni di trattamento.

## Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è IRIREACT e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare IRIREACT
3. Come usare IRIREACT
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare IRIREACT
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### 1. Che cos'è IRIREACT e a cosa serve

IRIREACT contiene i principi attivi feniramina maleato e tetrizolina cloridrato.

Feniramina maleato appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati "antistaminici" e agisce contrastando i sintomi dell'allergia.

Tetrizolina cloridrato appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati "decongestionanti" e agisce riducendo la dilatazione dei vasi del sangue.

IRIREACT si usa per trattare le allergie e le infiammazioni della membrana dell'occhio (congiuntiva) accompagnate da ipersensibilità alla luce (fotofobia), lacrimazione, sensazione di corpo estraneo, dolore.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 4 giorni di trattamento.

### 2. Cosa deve sapere prima di usare IRIREACT

#### Non usi IRIREACT:

- se è allergico a feniramina maleato o a tetrizolina cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è allergico ad altri medicinali della stessa famiglia di feniramina maleato e tetrizolina cloridrato, in particolare xilometazolina, oximetazolina, nafazolina;
- se ha una malattia dovuta ad una elevata pressione all'interno dell'occhio (glaucoma ad angolo stretto/chiuso) o se soffre di altre gravi malattie dell'occhio;
- se è per un bambino al di sotto dei 12 anni;
- se è in gravidanza o sta allattando (vedere "Gravidanza e allattamento");
- se è in trattamento contemporaneo con medicinali utilizzati per la depressione (inibitori delle monoamminossidasi, come tranilcipromina, fenzelina, pargilina) (vedere "Altri medicinali e IRIREACT").

#### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare IRIREACT:

- se soffre di pressione del sangue elevata (ipertensione);
- se soffre di una eccessiva attività di una ghiandola chiamata tiroide (ipertiroidismo);
- se ha disturbi al cuore;

- se ha elevati livelli di zuccheri nel sangue (iperglicemia, diabete);
- se soffre di infezioni o pus nell'occhio;
- se ha corpi estranei nell'occhio;
- se ha problemi agli occhi di varia natura (meccanici, chimici, da calore).

L'uso, specie se prolungato, dei medicinali ad uso locale può causare allergie (fenomeni di sensibilizzazione). In tal caso il medico le chiederà di interrompere il trattamento e le consiglierà una terapia opportuna.

Non usi questo medicinale per più di 4 giorni consecutivi, salvo diversa prescrizione medica, in quanto in caso contrario possono verificarsi effetti indesiderati. IRIREACT nella confezione flacone multidose contiene benzalconio cloruro come conservante che può causare reazioni allergiche. Durante il trattamento non deve indossare le lenti a contatto e può indossarle solo 15 minuti dopo l'uso del medicinale. Se manifesta allergia al benzalconio cloruro o indossa lenti a contatto può utilizzare IRIREACT nella confezione contenitore monodose che non contiene conservanti.

#### Bambini e adolescenti

IRIREACT non deve essere usato nei bambini al di sotto dei 12 anni.

#### Altri medicinali e IRIREACT

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale. In particolare informi il medico se sta assumendo medicinali appartenenti alla classe degli inibitori della monoamminossidasi (usati per trattare la depressione). L'uso concomitante di IRIREACT e questo tipo di medicinali può causare un grave aumento della pressione del sangue, pertanto la somministrazione contemporanea è controindicata.

#### Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

In gravidanza e durante l'allattamento usi IRIREACT solo in caso di effettiva necessità, sotto il diretto controllo del medico.

#### Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti effetti sulla capacità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari. IRIREACT flacone contiene benzalconio cloruro che può causare reazioni allergiche; pertanto qualora la sua vista dovesse risultare offuscata subito dopo l'applicazione di IRIREACT non deve guidare veicoli né utilizzare macchinari fino a quando la sua vista non tornerà nitida.

#### IRIREACT nella confezione flacone multidose contiene benzalconio cloruro

Questo medicinale nella confezione flacone multidose contiene 0,012 mg di benzalconio cloruro per la dose massima giornaliera raccomandata di 6 gocce (0,24 ml), equivalente a 0,05 mg/ml.

Benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore. Tolga le lenti a contatto prima di usare questo medicinale e aspetti 15 minuti prima di riapplicarle.

Benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l'occhio secco o disturbi alla

cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.

### 3. Come usare IRIREACT

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulta il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 1-2 gocce da applicare nell'occhio interessato 2 o 3 volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate.

Un dosaggio superiore del prodotto anche se assunto localmente e per breve periodo di tempo può dar luogo ad effetti indesiderati gravi a carico di tutto l'organismo (Vedere paragrafo 4 "Possibili effetti indesiderati").

Non usi questo prodotto per più di 4 giorni consecutivi, salvo diversa prescrizione medica, stante la possibilità che possano verificarsi in caso contrario effetti indesiderati.

Se i sintomi persistono o si aggravano consulta il medico.

#### Istruzioni per l'uso

Per aprire, premere la capsula di chiusura e contemporaneamente svitare. Dopo l'uso richiudere avvitando a fondo.

### Uso nei bambini e negli adolescenti

IRIREACT non deve essere usato nei bambini al di sotto dei 12 anni.

### Se usa più IRIREACT di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione di una dose eccessiva di IRIREACT contatti immediatamente il medico e si rivolga al più vicino ospedale.

Il medicinale, se accidentalmente ingerito o impiegato per un lungo periodo a dosi eccessive, può determinare fenomeni tossici. L'ingestione accidentale del farmaco, specialmente nei bambini, può causare depressione del sistema nervoso centrale che può manifestarsi con forte rilassamento fisico e mentale: forte sonnolenza (sedazione spiccata), coma.

### Se dimentica di usare IRIREACT

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### Se interrompe il trattamento con IRIREACT

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista. Prima di interrompere il trattamento si rivolga al medico.

### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Durante il trattamento con IRIREACT potrebbe manifestare reazioni allergiche, in tal caso INTERRUPE immediatamente il trattamento, e contatti il medico che, se necessario, potrà darle una cura idonea.

Durante il trattamento con IRIREACT potrebbe inoltre manifestare i seguenti effetti indesiderati:

Effetti che riguardano l'occhio:

- dilatazione della pupilla;
- aumento della pressione all'interno dell'occhio.

Effetti che riguardano tutto l'organismo:

- aumento della pressione del sangue (ipertensione);
- disturbi del cuore;
- aumento dei livelli di zucchero nel sangue (iperglicemia);
- nausea;
- mal di testa.

Nei bambini se accidentalmente ingerito, il preparato può determinare uno stato di sonnolenza anche profondo (sopore), e diminuita attività (ipotonia).

Raramente possono manifestarsi fenomeni di ipersensibilità. In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico che, se necessario, le darà una terapia appropriata.

### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### 5. Come conservare IRIREACT

Non conservare a temperatura superiore ai 30° C.

Dopo la prima apertura del flacone multidose utilizzi il medicinale entro 28 giorni.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### Cosa contiene IRIREACT

- I principi attivi sono: feniramina maleato e tetrisolina cloridrato. 100 ml di soluzione contengono 0,30 g di feniramina maleato e 0,05 g di tetrisolina cloridrato.
- Gli altri componenti sono: acido bórico, borace, **benzalcloruro**, acqua per preparazioni iniettabili.

#### Descrizione dell'aspetto di IRIREACT e contenuto della confezione

IRIREACT si presenta in forma di collirio, soluzione (da versare goccia a goccia direttamente nell'occhio).

IRIREACT è disponibile in confezioni da 1 flacone contagocce in LDPE da 10 ml.

#### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Genetic S.p.A. Via G. Della Monica, 26- 84083 Castel San Giorgio (SA).

#### Produttore

Genetic S.p.A. Contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Concessionario esclusivo per la vendita:  
**MONTEFARMACO OTC S.p.a.**  
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)